

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Belarus**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	toelichting
2.26	29-5-2024	Toevoegingen dekking perceelsvrijheid
2.25	28-1-2024	Bijschrijving voor planten geteeld in kas toegevoegd
2.24	25-1-2023	Update n.a.v. wijzigingen in regelgeving

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt - *Belarus*

BELARUS (Wit-Rusland) (BY)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1	20	E	-	Nee*

Met ingang van 1 februari 2014 geldt er een invoerverbod voor boomkwekerijproducten en bloemkwekerijproducten m.u.v. planten voor zover in kas geteeld en of in pot, snijbloemen, siertakken en droogbloemen. Het moet aannemelijk zijn dat de planten in kas en of in pot zijn geteeld, zodra daar enige twijfel over bestaat dan moet de exporteur aannemelijk kunnen maken dat de planten in de kas zijn geteeld.

* Belarus geeft blijkbaar wel invoervergunningen af, die bovengenoemd invoerverbod ongedaan maakt. Om export mogelijk te maken, moeten dergelijke permits worden ingestuurd naar pd.permit@minInv.nl t.b.v. een Instructie voor invoervergunning (IVI). Indien export mogelijk is, moet worden voldaan aan de eisen die in dit landenoverzicht worden genoemd

Algemene eisen

Transito: met zendingen planten/plantaardige producten in transit door Belarus dient u een fytosanitair certificaat van het land van bestemming te kunnen tonen en wordt de zending mogelijk geïnspecteerd.

Certificaat vereist voor:

Bloemkwekerijproducten inclusief droogbloemen
Boomkwekerijproducten

Inspectie vereist voor:

Bloemkwekerijproducten inclusief droogbloemen
Boomkwekerijproducten

Invoerverbod

Geen#

Producteisen

De eisen/bijschrijvingen gelden voor alle herkomsten.

Voor buitenlands materiaal moet gebieds- of perceelsvrijheid (resp. 'zone' en 'production site' van het genoemde organisme blijken uit het fytosanitair certificaat, attest of pre-exportcertificaat uit het land van herkomst. Zie Overzicht verklaringen.

Voor Nederlands materiaal staat bij de specifieke eisen waaraan voldaan moet worden, of er staat in het Overzicht verklaringen dat NL-materiaal niet voor certificering in aanmerking komt.

Standaardeisen

Zie de registers "Basisnormen Nederland voor Sierteelt" en "Q-organismen"

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Belarus**

Specifieke eisen

De inspectieplichtige producten moeten vrij zijn (= 0-tolerantie) van de organismen genoemd in het register "Q-organismen Euraziatische Economische Unie". Producten moeten **absoluut** vrij zijn van *Frankliniella occidentalis*, de Californische trips.

A:Voor producten m.u.v. snijbloemen en m.u.v. siertakken voor zover niet afkomstig van bomen, van origine Nederland

Camellia moet aantoonbaar afkomstig zijn van een perceel welke tijdens een veldinspectie, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten (in NL de Keuringsdienst / NVWA), is vrij bevonden van *Ciborinia camelliae*.*

Chrysanthemum eindproduct moet aantoonbaar afkomstig zijn van een perceel welke tijdens een veldinspectie, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten (in NL de Keuringsdienst / NVWA), is vrij bevonden van *Chrysanthemum stem necrosis virus*, *Chrysanthemum stunt viroid*, *Didymella ligulicola*, *Puccinia horiana*, *Tomato spotted wilt virus*.

Voor opplant bestemde planten (incl. potplanten) van *Coniferae* (zie register Plantenfamilies), m.u.v. *Taxus* en *Thuja*, moeten aantoonbaar afkomstig zijn van een perceel welke tijdens een veldinspectie, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten (in NL de Keuringsdienst / NVWA), is vrij bevonden van *Leptoglossus occidentalis*.*

Pelargonium eindproduct moet aantoonbaar afkomstig zijn van een perceel welke tijdens een veldinspectie, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten (in NL de Keuringsdienst / NVWA), is vrij bevonden van *Puccinia pelargonii-zonalis*, *Ralstonia solanacearum*.

Voor opplant bestemde planten (incl. potplanten) van *Prunus*, moeten aantoonbaar afkomstig zijn van een perceel welke tijdens een veldinspectie, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten (in NL de Keuringsdienst / NVWA), is vrij bevonden van *Plum pox virus*.*

Voor opplant bestemde planten (incl. potplanten) van *Fraxinus*, moeten aantoonbaar afkomstig zijn van een bedrijf welke tijdens een veldinspectie, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten (in NL de Keuringsdienst / NVWA), is vrij bevonden van *Chalara fraxinea*.*

Rubus idaeus en *Olea europaea* moet aantoonbaar afkomstig zijn van een perceel welke tijdens een veldinspectie, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten (in NL Naktuinbouw), is vrij bevonden van *Colletotrichum acutatum*.*

Planten van:

- *Rubus*
- Vaste planten
- Voortkweekingsmateriaal t.b.v. de teelt van (sub)tropische gewassen
- Voortkweekingsmateriaal van bessen, bloemen en groenteplanten

moeten aantoonbaar afkomstig zijn van een perceel welke tijdens een veldinspectie, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten (in NL Naktuinbouw), is vrij bevonden van *Impatiens necrotic spot virus*.*

Planten, (oorspronkelijk) buiten geteeld in de volle grond van:

- Vaste planten
- Loofhoutsoorten m.u.v. *Alnus*, *Fraxinus* en *Rosaceae* (zie register Plantenfamilies), van siergewassen
- Voortkweekingsmateriaal van bessen, bloemen en groenteplanten

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Belarus**

-
- Voortkwekingsmateriaal t.b.v. de teelt van (sub)tropische gewassen
 - Carya
 - Juglans
 - Malus
 - Prunus
 - Pyrus
 - Rubus
 - Vaccinium
 - Potplanten

moeten aantoonbaar afkomstig zijn van een perceel welke tijdens een veldinspectie, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten (in NL Naktuinbouw), is vrij bevonden van *Meloidogyne chitwoodi* en *Meloidogyne fallax*.*

Planten, (oorspronkelijk) buiten geteeld in de volle grond van:

- *Fragaria*
- Voortkwekingsmateriaal van bessen, bloemen en groentepplanten
- Voortkwekingsmateriaal t.b.v. de teelt van (sub)tropische gewassen
- Potplanten

moeten aantoonbaar afkomstig zijn (AM-vrij verklaring) van een perceel vrij van aardappelmoeheid, *Globodera pallida* en *Globodera rostochiensis*.

Fragaria moet aantoonbaar tijdens het groeiseizoen zijn geïnspecteerd en vrij bevonden van *Anthonomus signatus*, *Colletotrichum acutatum*, *Impatiens necrotic spot virus*, *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne enterolobii*, *Meloidogyne fallax*, *Phymatotrichopsis omnivora*, *Phytophthora fragariae*, *Raspberry ringspot virus*, *Synchytrium endobioticum*, *Tobacco ringspot virus*, *Tomato ringspot virus* en *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*, *Xiphinema rivesi*. Gecertificeerd materiaal voldoet aan deze eis.

Vaste planten moeten afkomstig zijn van percelen vrij van *Chrysanthemum stunt viroid**, *Impatiens necrotic spot virus**, *Potato spindle tuber viroid** en *Tomato spotted wilt virus**.

- * Perceelsvrijheid van betreffende organisme moet worden aangetoond d.m.v. één van de volgende opties:
- Naktuinbouw document "Rapportage Keuringstoezicht" (RKT) met keuringsbeslissing(geschikt EAEU) perceel.
 - Bedrijven waarvan het perceel is geïnspecteerd op de eisen voor de EAEU landen en zijn opgenomen in het register "register EAEU". Op basis van het keurobject nummer, vermeld op het leveranciersdocument of op de inspectielijst vanuit e-CertNL kan door de keurmeester in het register gekeken worden of het perceel voldoet aan de eisen. Het keurobjectnummer dient in e-CertNL ingevoerd te worden in het veld referentie op zendingsniveau.
 - Voor vaste planten geldt dat partijen waarvan een Naktuinbouw partijnummer bekend is, er geen RKT hoeft te worden overlegd. Deze goedgekeurde Naktuinbouw nummers zijn te velde geïnspecteerd en voldoen aan de eisen.
 - Voor gecertificeerde fruitgewassen incl. onderstammen met een officieel EU-certificeringslabel (dit label is altijd gecombineerd met het plantenpaaspoort) hoeft er geen RKT te worden overlegd en is geen opname in register nodig. Deze partijen hebben een partijnummer wat gelinkt is aan unieke percelen. Ze zijn ook zodanig gelabeld en traceerbaar. Zij komen altijd van percelen die te velde zijn geïnspecteerd.

Voor:

- Siertakken van Coniferae (zie register Plantenfamilies), m.u.v. *Pinus*, *Taxus* en *Thuja*
- Siertakken van loofhoutsoorten

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Belarus**

-
- Asparagus voor sierdoeleinden
 - Planten van Taxus en Thuja
 - Planten van Castanea, Chrysolepis chrysophylla, Fagus sylvatica, Lithocarpus densiflorus, Quercus,
 - Loofhoutsoorten van sierplanten m.u.v. Alnus, Betula, Fraxinus en Rosaceae (zie register Plantenfamilies)

gelden specifieke eisen m.b.t. het teeltgebied, waaraan Nederland niet voldoet.
Deze producten van Nederlandse origine komen niet voor export in aanmerking.

B: Voor producten m.u.v. snijbloemen en m.u.v. siertakken voor zover niet afkomstig van bomen, van origine niet-Nederland

Alternatieve verklaringen benodigd op een fyto-sanitair certificaat, pre-exportcertificaat of attest, bij certificering van materiaal uit het buitenland.

Daar waar staat 'production site', mag ook staan 'zone' of 'place of production'.

Let op, de benodigde verklaring kan uit meerdere onderdelen bestaan!

POTPLANTEN, binnen of buiten geteeld, met grond (zand en/of klei) als groeimedium

The plants originate from a production site free from Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne enterolobii, Meloidogyne fallax, Xiphinema americanum sensu stricto, Xiphinema bricolense, Xiphinema californicum en Xiphinema rivesi.

SIERTAKKEN VAN CONIFERAE (zie register Plantenfamilies), M.U.V. PINUS, TAXUS THUJA)

The plants originate from a zone free from Acleris gloverana, Acleris variana, Atropellis pinicola, Atropellis piniphila, Bursaphelenchus xylophilus, Choristoneura fumiferana, Choristoneura occidentalis, Cronartium fusiforme, Cronartium quercuum, Dendroctonus rufipennis, Endocronartium harknessii, Gymnosporangium yamadae, Ips calligraphus, Ips grandicollis, Ips pini, Ips plastographus, Malacosoma disstria, Mycosphaerella dearnessii, Mycosphaerella gibsonii, Mycosphaerella laricis-leptolepidis, Phytophthora ramorum, Pissodes strobi, Pissodes terminalis.

SIERTAKKEN VAN PINUS (incl. kerstbomen)

The plants originate from a production site free from Atropellis pinicola, Atropellis piniphila, Bursaphelenchus xylophilus, Ips calligraphus, Ips emarginatus, Ips grandicollis, Ips pini, Ips plastographus, Monochamus alternatus, Monochamus carolinensis, Monochamus clamator, Monochamus marmorator, Monochamus mutator, Monochamus notatus, Monochamus obtusus, Monochamus scutellatus, Monochamus titillator, Mycosphaerella dearnessii, Pseudips mexicanus.

SIERTAKKEN VAN LOOFHOUT-SOORTEN

The plants originate from a zone free from Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Ceratocystis fagacearum, Chalara fraxinea, Phytophthora kernoviae, Phytophthora ramorum.

PLANTEN

ALLIUM (voortkweekingsmateriaal)

The plants originate from a production site free from Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne enterolobii, Meloidogyne fallax, Nacobbus aberrans, Phymatotrichopsis omnivora, Sunchytrium endobioticum, Tomato spotted wilt virus, Xanthomonas axonopodis pv. allii, Xiphinema rivesi.

ALNUS

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Belarus**

The plants originate from a production site free from *Phytophthora alni*.

AMELANCHIER

The plants originate from a production site free from *Erwinia amylovora*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

ASPARAGUS (sierdoeleinden)

The plants originate from a zone free from *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Meloidogyne fallax*, *Popillia japonica*, Tobacco ringspot virus.

BETULA

The plants originate from a zone free from *Agrilus anxius*, *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Malacosoma americanum*, *Malacosoma disstria*.

The plants originate from a production site free from *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Heterodera glycines*, *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne enterolobii*, *Meloidogyne fallax*, *Synchytrium endobioticum*, *Xiphinema rivesi*.

CAMELLIA

The plants originate from a production site free *Ciborinia camelliae*.

CAPSICUM ANNUUM (voortkweekingsmateriaal)

The plants originate from a production site free from *Pepino mosaic virus*, *Tomato brown rugose fruit virus*, *Tomato spotted wilt virus*.

CARYA (beworteld)

The plants originate from a production site free from *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne fallax*, *Monilinia fructicola*, *Phymatotrichopsis omnivora*, *Raspberry ringspot virus*, *Tobacco ringspot virus*, *Tomato ringspot virus*, *Synchytrium endobioticum* and *Xylella fastidiosa*.

Aanvullend voor CARYA ILLINOINENSIS

The plants originate from a zone free from *Phymatotrichopsis omnivora*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

CASTANEA

The plants originate from a zone free from *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Ceratocystis fagacearum*, *Chrysomphalus dictyospermi*, *Corythucha arcuata*, *Cronartium quercuum*, *Dryocosmus kuriphilus*, *Malacosoma americanum*, *Malacosoma disstria*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

The plants originate from a production site free from *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Heterodera glycines*, *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne enterolobii*, *Meloidogyne fallax*, *Phymatotrichopsis omnivora*, *Phytophthora ramorum*, *Phytophthora kernoviae*, *Synchytrium endobioticum*, *Xiphinema rivesi*.

CHRYSOLEPIS CHRYSOPHYLLA (syn. *Castanopsis chrysophylla*)

The plants originate from a zone free from *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Ceratocystis fagacearum*, *Chrysomphalus dictyospermi*, *Corythucha arcuata*, *Cronartium quercuum*, *Dryocosmus kuriphilus*, *Malacosoma americanum*, *Malacosoma disstria*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

The plants originate from a production site free from *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Heterodera glycines*, *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne enterolobii*, *Meloidogyne fallax*, *Phytophthora ramorum*, *Phytophthora kernoviae*, *Synchytrium endobioticum*, *Xiphinema rivesi*.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Belarus**

CHAENOMELES JAPONICA

The plants originate from a production site free from *Erwinia amylovora*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

CHRYSANTHEMUM

The plants originate from a production site free from *Chrysanthemum stem necrosis virus*, *Chrysanthemum stunt viroid*, *Didymella ligulicola*, *Puccinia horiana*, *Tomato spotted wilt virus*.

CONIFERAE (zie register Plantenfamilies), M.U.V. TAXUS, THUJA

The plants originate from a zone free from *Acleris gloverana*, *Acleris variana*, *Atropellis pinicola*, *Atropellis piniphila*, *Bursaphelenchus xylophilus*, *Choristoneura fumiferana*, *Choristoneura occidentalis*, *Cronartium fusiforme*, *Dendroctonus brevicomis*, *Dendroctonus ponderosae*, *Dendroctonus rufipennis*, *Dendroctonus valens*, *Gymnosporangium yamadae*, *Ips calligraphus*, *Ips grandicollis*, *Ips pini*, *Ips plastographus*, *Leptoglossus occidentalis*, *Monochamus alternatus*, *Monochamus carolinensis*, *Monochamus clamator*, *Monochamus marmorator*, *Monochamus mutator*, *Monochamus notatus*, *Monochamus obtusus*, *Monochamus scutellatus*, *Monochamus titillator*, *Mycosphaerella dearnesii*, *Mycosphaerella gibsonii*, *Mycosphaerella laricis-leptolepidis*, *Oligonychus perditus*, *Pissodes strobi*, *Pissodes terminalis*.

The plants originate from a production site free from *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Heterodera glycines*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*, *Xiphinema rivesi*.

COTONEASTER

The plants originate from a production site free from *Erwinia amylovora*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

CRATAEGUS

The plants originate from a production site free from *Erwinia amylovora*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

CUCURBITA

The plants originate from a production site free from *Acidovorax citrulli*.

CYDONIA

The plants originate from a production site free from *Candidatus phytoplasma pyri* and *Erwinia amylovora*.

DIANTHUS (voortkweekingsmateriaal)

The plants originate from a production site free from *Phialophora cinerescens*.

ERIOBOTRYA JAPONICA

The plants originate from a production site free from *Erwinia amylovora*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

FAGUS SYLVATICA

The plants originate from a zone free from *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Ceratocystis fagacearum*, *Chrysomphalus dictyospermi*, *Corythucha arcuata*, *Cronartium quercuum*, *Dryocosmus kuriphilus*, *Malacosoma americanum*, *Malacosoma disstria*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

The plants originate from a production site free from *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Heterodera glycines*, *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne enterolobii*,

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Belarus**

Meloidogyne fallax, Phytophthora ramorum, Phytophthora kernoviae, Synchytrium endobioticum, Xiphinema rivesi.

FRAGARIA

The plants originate from a production site free from Anthonomus signatus, Colletotrichum acutatum, Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne enterolobii, Meloidogyne fallax, Phymatotrichopsis omnivora, Phytophthora fragariae, Raspberry ringspot virus, Synchytrium endobioticum, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Xiphinema americanum sensu stricto, Xiphinema bricolense, Xiphinema californicum, Xiphinema rivesi.

FRAXINUS

The plants originate from a place of production free from Agrilus planipennis, Chalara fraxinea.

JUGLANS (beworteld)

The plants originate from a production site free from Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Monilinia fructicola, Phymatotrichopsis omnivora, Raspberry ringspot virus, Sirococcus clavigignenti-juglandacearum, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Synchytrium endobioticum and Xylella fastidiosa, Xiphinema americanum sensu stricto, Xiphinema bricolense, Xiphinema californicum.

LITHOCARPUS DENSIFLORUS

The plants originate from a zone free from Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Aromia bungii, Ceratocystis fagacearum, Chrysomphalus dictyospermi, Corythucha arcuata, Cronartium quercuum, Dryocosmus kuriphilus, Malacosoma americanum, Malacosoma disstria, Xiphinema americanum sensu stricto, Xiphinema bricolense, Xiphinema californicum.

The plants originate from a production site free from Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Heterodera glycines, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne enterolobii, Meloidogyne fallax, Phytophthora ramorum, Phytophthora kernoviae, Synchytrium endobioticum, Xiphinema rivesi.

MALUS (beworteld)

The plants originate from a production site free from Candidatus phytoplasma mali, Cherry rasp leaf virus, Erwinia amylovora, Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Gymnosporangium yamadae, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Monilinia fructicola, Phymatotrichopsis omnivora, Raspberry ringspot virus, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Synchytrium endobioticum and Xylella fastidiosa.

MALUS (onbeworteld)

The plants originate from a production site free from Candidatus phytoplasma mali, Cherry rasp leaf virus, Erwinia amylovora, Gymnosporangium yamadae.

OLEA EUROPAEA (beworteld)

The plants originate from a production site free from Colletotrichum acutatum, Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Phymatotrichopsis omnivora, Synchytrium endobioticum, Xiphinema americanum sensu stricto, Xiphinema bricolense, Xiphinema californicum, Xiphinema rivesi and Xylella fastidiosa.

PELARGONIUM

The plants originate from a production site free from Puccinia pelargonii-zonalis, Ralstonia solanacearum.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Belarus**

PETUNIA (voortkwekingsmateriaal)

The plants originate from a production site free from Potato spindle tuber viroid, Tomato yellow leaf curl virus.

PIPER (voortkwekingsmateriaal)

The plants originate from a production site free from Potato spindle tuber viroid, Tomato yellow leaf curl virus.

POPULUS

The plants originate from a zone free from Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Choristoneura conflictana, Xiphinema americanum sensu stricto, Xiphinema bricolense, Xiphinema californicum.

The plants originate from a production site free from Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Heterodera glycines, Melampsora medusae, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne enterolobii, Meloidogyne fallax, Synchytrium endobioticum, Xiphinema rivesi.

PRUNUS (beworteld)

The plants originate from a production site free from Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Monilinia fructicola, Phymatotrichopsis omnivora, Raspberry ringspot virus, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Synchytrium endobioticum and Xylella fastidiosa.

The plants originate from a zone free from Plum pox virus.

PRUNUS (onbeworteld)

The plants originate from a zone free from Plum pox virus.

Aanvullend voor PRUNUS ARMENIACA en PRUNUS DOMESTICA (be- en onbeworteld)

The place of production is free from Erwinia amylovora.

Aanvullend voor PRUNUS DULCIS en PRUNUS PERSICA (be- en onbeworteld)

The plants originate from a zone free from Peach latent mosaic viroid, Peach rosette mosaic virus.

Aanvullend voor PRUNUS AVIUM, PRUNUS MAHALEB en PRUNUS PERSICA (be- en onbeworteld)

The place of production is free from Cherry rasp leaf virus.

PYRACANTHA

The plants originate from a production site free from Erwinia amylovora, Xiphinema americanum sensu stricto, Xiphinema bricolense, Xiphinema californicum.

PYRUS (beworteld)

The plants originate from a production site free from Erwinia amylovora, Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Monilinia fructicola, Candidatus phytoplasma pyri, Phymatotrichopsis omnivora, Raspberry ringspot virus, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Synchytrium endobioticum and Xylella fastidiosa.

PYRUS (onbeworteld)

The plants originate from a production site free from Erwinia amylovora, Candidatus phytoplasma pyri.

QUERCUS

The plants originate from a zone free from Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Aromia bungii, Ceratocystis fagacearum, Chrysomphalus dictyospermi,

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Belarus**

Corythucha arcuata, *Cronartium quercuum*, *Dryocosmus kuriphilus*, *Malacosoma americanum*, *Malacosoma disstria*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

The plants originate from a production site free from *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Heterodera glycines*, *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne enterolobii*, *Meloidogyne fallax*, *Phytophthora ramorum*, *Phytophthora kernoviae*, *Synchytrium endobioticum*, *Xiphinema rivesi*.

RUBUS

The plants originate from a production site free from *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Impatiens necrotic spot virus*, *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne enterolobii*, *Meloidogyne fallax*, *Phymatotrichopsis omnivora*, *Phytophthora fragariae*, *Raspberry ringspot virus*, *Synchytrium endobioticum*, *Tobacco ringspot virus*, *Tomato ringspot virus*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*, *Xiphinema rivesi*.

Aanvullend voor RUBUS IDAEUS (be- en onbeworteld)

The *Colletotrichum acutatum*, *Impatiens necrotic spot virus* and *Phytophthora fragariae*.

SOLANUM LYCOPERSICUM (voortkweekingsmateriaal)

The plants originate from a production site free from *Potato spindle tuber viroid*, *Pepino mosaic virus*, *Ralstonia solanacearum*, *Tomato brown rugose fruit virus*, *Tomato spotted wilt virus*, *Tomato yellow leaf curl virus*.

SOLANUM MELONGENA (voortkweekingsmateriaal)

The plants originate from a production site free from *Pepino mosaic virus*, *Tomato brown rugose fruit virus*, *Tomato spotted wilt virus*.

SOLANUM MURICATUM (voortkweekingsmateriaal)

The plants originate from a production site free from *Pepino mosaic virus*.

SORBUS

The plants originate from a production site free from *Erwinia amylovora*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

STRANVAESIA

The plants originate from a production site free from *Erwinia amylovora*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

TAXUS

The plants originate from a zone free from *Oligonychus perditus*, *Phytophthora ramorum*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

The plants originate from a production site free from *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Heterodera glycines*, *Xiphinema rivesi*.

THUJA

The plants originate from a zone free from *Oligonychus perditus*, *Phytophthora ramorum*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

The plants originate from a production site free from *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Heterodera glycines*, *Xiphinema rivesi*.

VACCINIUM

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Belarus**

The plants originate from a production site free from *Diaporthe vaccinii*, *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne enterolobii*, *Meloidogyne fallax*, *Phymatotrichopsis omnivora*, *Phytophthora kernoviae*, *Phytophthora ramorum*, Raspberry ringspot virus, *Synchytrium endobioticum*, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*, *Xiphinema rivesi*.

VITIS

The plants originate from a zone free from *Margarodes vitis* and *Xylella fastidiosa*.
The plants originate from a production site free from *Aonidiella aurantii*, *Candidatus Phytoplasma vitis*, *Ceratitidis rosa*, *Ceroplastes japonicus*, *Ceroplastes rusci*, *Chrysomphalus dictyospermi*, *Maconellicoccus hirsutus*, Peach rosette mosaic virus, *Phymatotrichopsis omnivora*, *Pseudococcus citriculus*, *Pseudococcus comstocki*, Raspberry ringspot virus, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Viteus vitifoliae*, *Xylophilus ampelinus*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*, *Xiphinema rivesi*.

VASTE PLANTEN

The plants originate from a production site free from *Chrysanthemum stunt viroid*, *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Impatiens necrotic spot virus*, *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne enterolobii*, *Meloidogyne fallax*, *Nacobbus aberrans*, *Phymatotrichopsis omnivora*, Potato spindle tuber viroid, *Synchytrium endobioticum*, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Tomato spotted wilt virus, *Xanthomonas campestris pv. hyacinthi*, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*, *Xiphinema rivesi*.

LOOFHOUT SOORTEN, M.U.V. ALNUS, BETULA, CASTANEA, CASTANOPSIS CHRYSOPHYLLA, FAGUS SYLVATICA, FRAXINUS, LITHOCARPUS DENSIFLORUS, POPULUS, QUERCUS, ROSACEA (zie register Plantenfamilies) VAN SIERPLANTEN

The plants originate from a zone free from *Anoplophora glabripennis*, *Aonidiella aurantii*, *Aromia bungii*, *Ceroplastes rusci*, *Choristoneura rosaceana*, *Chrysomphalus dictyospermi*, *Cydia packardii*, *Cydia prunivora*, *Dryocosmus kuriphilus*, *Helicoverpa zea*, *Hyphantria cunea*, *Liriomyza huidobrensis*, *Liriomyza sativae*, *Liriomyza trifolii*, *Lopholeucaspis japonica*, *Maconellicoccus hirsutus*, *Malacosoma americanum*, *Malacosoma disstria*, *Melampsora medusae*, *Monilinia fructicola*, *Phymatotrichopsis omnivora*, *Phytophthora alni*, *Phytophthora ramorum*, *Phytophthora kernoviae*, *Popillia japonica*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Pseudococcus citriculus*, *Pseudococcus comstocki*, *Quadraspidotus perniciosus*, Raspberry ringspot virus, *Rhagoletis cingulata*, *Saperda candida*, *Sirococcus clavignenti-juglandacearum*, *Spodoptera eridania*, *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera litura*, *Spodoptera littoralis*, Tobacco ringspot virus, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*.

The plants originate from a production site free from *Erwinia amylovora*, *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Heterodera glycines*, *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne enterolobii*, *Meloidogyne fallax*, *Synchytrium endobioticum*, *Xiphinema rivesi*.

LOOFHOUT SOORTEN VAN ROSACEA (zie register Plantenfamilies)

The plants originate from a zone free from *Saperda candida*.

VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN BESSEN, BLOEMEN EN GROENTEPLANTEN

The plants originate from a production site free from *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, *Impatiens necrotic spot virus*, *Meloidogyne chitwoodi*, *Meloidogyne enterolobii*, *Meloidogyne fallax*, *Nacobbus aberrans*, *Ralstonia solanacearum*, *Synchytrium endobioticum*, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Xiphinema americanum sensu stricto*, *Xiphinema bricolense*, *Xiphinema californicum*, *Xiphinema rivesi*.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Belarus**

VOORTKWEKINGSMATERIAAL T.B.V. DE TEELT VAN (SUB)TROPISCHE) GEWASSEN (zoals Ananas, Citrus, Ficus, Mangifera indica, Palmae, Persea americana

The plants originate from a production site free from Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Impatiens necrotic spot virus, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne enterolobii, Meloidogyne fallax, Synchytrium endobioticum, Xylella fastidiosa, Xiphinema americanum sensu stricto, Xiphinema bricolense, Xiphinema californicum, Xiphinema rivesi.

PLANTEN OP POT, binnen of buiten geteeld, met grond (zand en/of klei) als groeimedium

The plants originate from a production site free from Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne enterolobii, Meloidogyne fallax, Xiphinema americanum sensu stricto, Xiphinema bricolense, Xiphinema californicum en Xiphinema rivesi.

Eisen met betrekking tot monsternamen

Geen

Certificeringseisen

Bijschrijving

ALGEMEEN voor alle potplanten en overige genoemde product(groep)en zoals vermeld in deze landeneis

Regulated products are grown in zones, places and (or) sites of production free from the quarantine pests in accordance with the Common Requirements approved by the Decision No.157 of the Council of the Eurasian Economic Commission of 30.11.2016.

Planten geteeld in een kas (n.v.t. voor snijbloemen, siertakken en droogbloemen):

Plants grown in greenhouses.

Overige voorschriften

Verpakking

Nieuw fust.

Chemische middelen

Stekken, zaailingen en onderstammen van Carya, Fragaria, Juglans, Malus, Olea europaea, Prunus, Pyrus, Rubus en Vaccinium moeten behandeld zijn tegen schildluizen overeenkomstig de toelatingen vermeld in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift; behandeling vermelden in ruimte 12 - 17 van het fytosanitair certificaat.

Post en handbagage:

Alle gereguleerde producten, onafhankelijk van de hoeveelheid (bijvoorbeeld een stuk fruit, een zakje bloembollen of potplant), die per post worden verstuurd of door een passagier worden meegenomen moeten vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat. Snijbloemen, tot maximaal 3 boeketten, zijn hiervan uitgezonderd.

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.